

## EVALUATIE EIGEN ANTIBIOTICAPRESCRIPTIE TIEL TEAM 1

Algemene voorschrijfgegevens, verkregen via Tielse apotheken:

Totale antibioticaprescriptie: 3409 recepten/11019 patiënten (310\*/1000)  
(exclusief avond, weekend)  
Landelijk: ±340 recepten/1000 inwoners  
(inclusief avond, weekend)

	Landelijk (%)	Totale prescriptie Team 1 (%)
Tetracyclines:	18	23
Amoxicilline:	20	12
Fenoxymethylpen/Feneticilline:	4	3
Flucloxacilline:	4	3
<b>Amoxicilline/clavulaanzuur:</b> (Augmentin)	<b>14</b>	<b>12*</b>
Cefalosporines:	0.4	0.5
Trimethoprim:	4	2
Co-trimoxazol: (Bactrimel)	3	3
<b>Macroliden:</b> (Zithromax, Klacid)	<b>13</b>	<b>15*</b>
<b>Chinolonen:</b> (Ciproxin)	<b>8</b>	<b>11*</b>
Nitrofurantoïne: (Furadantine)	11	15
Overige:	1	0.5
	-----	-----
	100%	100%

### Met betrekking tot deze cijfers...

De via apotheken verkregen gegevens geven een globale indicatie van uw prescriptiegedrag. Het zijn aantallen prescripties per 1000 ingeschreven patiënten over het afgelopen jaar. Nadeel van deze cijfers is dat ze niet gekoppeld zijn aan een diagnose en het onbekend is welk gedeelte is voorgeschreven voor luchtwegklachten (de schatting hiervoor is 70%). De resultaten van de registratieperiode geven wel inzicht in geëigend voorschrijven en het voorschrijven van eerste keuze middelen.

## Geëigend voorschrijven (registratieresultaten Team 1)

### OMA

	richtlijn	aangewezen	overwegen	niet
voorgeschreven		3	11	
niet voorgeschreven		1**	12	8

### Keelpijn

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		6	7*
niet voorgeschreven		2**	50

### Rhinosinusitis/verkoudheid

	richtlijn	overwegen	niet
voorgeschreven		14	15*
niet voorgeschreven		4	32

### Hoesten, lage luchtwegklachten

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		26	18*
niet voorgeschreven			37

Ab-prescriptie in 41% van de consulten

\* overprescriptie: 16% van de consulten (40/246) = 40% van alle prescripties

\*\* onderprescriptie: 1% van de consulten (3/246) = 2% van alle niet-prescripties

## Gebruik 1<sup>ste</sup> keuze middelen (registratieresultaten)

Voorschrijven 1<sup>ste</sup> keuze middelen: 72% (72/100)

Voorschrijven 2<sup>de</sup> keuze middelen:

OMA: 2x Augmentin  
Keelklachten: 1x Claritromycine, 1x Doxycycline, 1x Augmentin, 1x Zithromax  
Verkoudheid: 4x Claritromycine, 1x Augmentin, 3x Zithromax, 1x Ceclor  
Hoest: 9x Claritromycine, 1x Ciproxin, 1x Augmentin, 1x Roxytromycine,  
1x Co-trimoxazol

## EVALUATIE EIGEN ANTIBIOTICAPRESCRIPTIE BANK (15)

Algemene voorschrijfgegevens, verkregen via Tielse apotheken:

Totale antibioticaprescriptie: 549 recepten/2592 patiënten (212/1000)  
Landelijk: ±340 recepten/1000 inwoners  
(inclusief avond, weekend)

	Landelijk (%)	Uw totale prescriptie (%)
Tetracyclines:	18	26
Amoxicilline:	20	15
Fenoxymethylpen/Feneticilline:	4	5
Flucloxacilline:	4	3
<b>Amoxicilline/clavulaanzuur:</b> (Augmentin)	<b>14</b>	<b>12</b>
Cefalosporines:	0.4	0.3
Trimethoprim:	4	1
Co-trimoxazol: (Bactrimel)	3	2
<b>Macroliden:</b> (Zithromax, Klacid)	<b>13</b>	<b>9</b>
<b>Chinolonen:</b> (Ciproxin)	<b>8</b>	<b>8</b>
Nitrofurantoïne: (Furadantine)	11	18
Overige:	1	0.7
	-----	-----
	100%	100%

## Geëigend voorschrijven (registratieresultaten)

### OMA

	richtlijn	aangewezen	overwogen	niet
voorgeschreven		1	2	
niet voorgeschreven			1	2

### Keelpijn

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		2	3*
niet voorgeschreven		1**	9

\*\* zeer gezwollen, pijnlijke klieren in gehele hals

### Rhinosinusitis/verkoudheid

	richtlijn	overwogen	niet
voorgeschreven		2	1*
niet voorgeschreven			7

### Hoesten, lage luchtwegklachten

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		6	2*
niet voorgeschreven			1

\* overprescriptie: 15% (6/40) = 32% van alle prescripties

\*\* onderprescriptie: 2% (1/40) = 5% van alle niet-prescripties

## Indicatoren niet-geëigend voorschrijven

**Keelpijn:** 136-13, 136-22, 136-23  
diagnose: tonsillitis/pharyngitis/laryngitis, koorts, exsudaat

**Rhinosinusitis:** 136-14  
diagnose: sinusitis, koorts, wens patiënt

**Hoesten:** 136-19, 136-35  
diagnose: bronchitis, afwijking bij auscultatie, koorts

## Gebruik 1<sup>ste</sup> keuze middelen (registratieresultaten)

Voorschrijven 1<sup>ste</sup> keuze middelen: 74% (14/19)

Voorschrijven 2<sup>de</sup> keuze middelen:

Keelklachten (2/5): 1x Claritromycine  
1x Doxycycline

Verkoudheid (1/5): 1x Claritromycine

Hoest (2/8) 1x Claritromycine  
1x Ciproxin

## EVALUATIE EIGEN ANTIBIOTICAPRESCRIPTIE REESINK (16)

Algemene voorschrijfgegevens, verkregen via Tielse apotheken:

Totale antibioticaprescriptie: 1661 recepten/3371 patiënten (493/1000)  
Landelijk: ±340 recepten/1000 inwoners  
(inclusief avond, weekend)

	Landelijk (%)	Uw totale prescriptie (%)
Tetracyclines:	18	19
Amoxicilline:	20	12
Fenoxymethylpen/Feneticilline:	4	2
Flucloxacilline:	4	3
<b>Amoxicilline/clavulaanzuur:</b> (Augmentin)	<b>14</b>	<b>11</b>
Cefalosporines:	0.4	1
Trimethoprim:	4	1
Co-trimoxazol: (Bactrimel)	3	3
<b>Macroliden:</b> (Zithromax, Klacid)	<b>13</b>	<b>21</b>
<b>Chinolonen:</b> (Ciproxin)	<b>8</b>	<b>12</b>
Nitrofurantoïne: (Furadantine)	11	14
Overige:	1	1
	-----	-----
	100%	100%

## Geëigend voorschrijven (registratieresultaten)

### OMA

	richtlijn	aangewezen	overwegen	niet
voorgeschreven		1	7	
niet voorgeschreven			3	1

### Keelpijn

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		3	2*
niet voorgeschreven			12

### Rhinosinusitis/verkoudheid

	richtlijn	overwegen	niet
voorgeschreven		6	6*
niet voorgeschreven		2	6

### Hoesten, lage luchtwegklachten

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		8	7*
niet voorgeschreven			17

\* overprescriptie: 19% (15/81) = 38% van alle prescripties

\*\* onderprescriptie: 0% (0/81) = 0% van alle niet-prescripties

## Indicatoren niet-geëigend voorschrijven

**Keelpijn:** 137-13, 138-01  
diagnose: tonsillitis, pharyngitis, exsudaat, wens patiënt

**Rhinosinusitis:** 137-11, 137-15, 138-03, 138-20, 138-35, 139-07  
diagnose: sinusitis, wens patiënt, eerder contact, koorts

**Hoesten:** 137-02, 137-06, 137-20, 138-12, 138-15, 138-19, 139-01, 139-08  
diagnose: bronchitis, wens patiënt, afwijking bij auscultatie, purulent sputum, koorts, eerder contact

## Gebruik 1<sup>ste</sup> keuze middelen (registratieresultaten)

Voorschrijven 1<sup>ste</sup> keuze middelen: 55% (22/40)

Voorschrijven 2<sup>de</sup> keuze middelen:

OMA (1/8): 1x Augmentin

Keelklachten (2/5): 1x Augmentin, 1x Zitromax

Verkoudheid (8/12): 1x Augmentin, 3x Claritromycine  
3x Zithromax, 1x Ceclor

Hoest (7/15) 5x Claritromycine, 1x Augmentin  
1x Roxytromycine

## EVALUATIE EIGEN ANTIBIOTICAPRESCRIPTIE SASSEN (18)

Algemene voorschrijfgegevens, verkregen via Tielse apotheken,

Totale antibioticaprescriptie: 674 recepten/2430 patiënten (277/1000)  
Landelijk: ±340 recepten/1000 inwoners  
(inclusief avond, weekend)

	Landelijk (%)	Uw totale prescriptie (%)
Tetracyclines:	18	23
Amoxicilline:	20	14
Fenoxymethylpen/Feneticilline:	4	6
Flucloxacilline:	4	3
<b>Amoxicilline/clavulaanzuur:</b> (Augmentin)	<b>14</b>	<b>16*</b>
Cefalosporines:	0.4	0
Trimethoprim:	4	6
Co-trimoxazol: (Bactrimel)	3	2
<b>Macroliden:</b> (Zithromax, Klacid)	<b>13</b>	<b>9*</b>
<b>Chinolonen:</b> (Ciproxin)	<b>8</b>	<b>13*</b>
Nitrofurantoinen: (Furadantine)	11	8
Overige:	1	0
	-----	-----
	100%	100%

\* Aandachtspunten verbeterplan

## Geëigend voorschrijven (registratieresultaten)

### OMA

	richtlijn	aangewezen	overwegen	niet
voorgeschreven		1	2	
niet voorgeschreven		1**	4	2

\*\* 141-02: kind jonger dan 6 maanden

### Keelpijn

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven			2*
niet voorgeschreven		1**	13

\*\* 141-50: zeer gezwollen/pijnlijke klieren in gehele hals

### Rhinosinusitis/verkoudheid

	richtlijn	overwegen	niet
voorgeschreven		4	7*
niet voorgeschreven		2	14

### Hoesten, lage luchtwegklachten

	richtlijn	aangewezen	niet
voorgeschreven		10	4*
niet voorgeschreven			10

\* overprescriptie: 17% (13/77) = 43% van alle prescripties

\*\* onderprescriptie: 3% (2/77) = 4% van alle niet-prescripties

## Indicatoren niet-geëigend voorschrijven

**Keelpijn:** 141-22, 149-08  
diagnose: tonsillitis, koorts, exsudaat  
aantal episodes, duur van de klachten

**Rhinosinusitis:** 141-12, 141-19, 141-23, 141-35, 141-37, 141-44, 149-16  
diagnose: sinusitis, wens patiënt, verergering klachten

**Hoesten:** 141-04, 141-08, 141-17, 149-43  
diagnose: bronchitis, wens patiënt, duur klachten, afw auscultatie, koorts, purulent sputum

## Gebruik 1<sup>ste</sup> keuze middelen (registratieresultaten)

Voorschrijven 1<sup>ste</sup> keuze middelen: 93% (28/30)

Voorschrijven 2<sup>de</sup> keuze middelen:

Oorklachten (1/3): 1x Augmentin

Hoest (1/14) 1x Klacid

## EVALUATIE EIGEN ANTIBIOTICAPRESCRIPTIE SCHREUDERS (19)

Algemene voorschrijfgegevens, verkregen via Tielse apotheken:

Totale antibioticaprescriptie: 525 recepten/2626 patiënten (200/1000)  
Landelijk: ±340 recepten/1000 inwoners  
(inclusief avond, weekend)

	Landelijk (%)	Uw totale prescriptie (%)
Tetracyclines:	18	28
Amoxicilline:	20	7
Fenoxymethylpen/Feneticilline:	4	3
Flucloxacilline:	4	6
Amoxicilline/clavulaanzuur: (Augmentin)	14	4
Cefalosporines:	0.4	0.4
Trimethoprim:	4	2
Co-trimoxazol: (Bactrimel)	3	6
<b>Macroliden:</b> (Zithromax, Klacid)	<b>13</b>	<b>11</b>
<b>Chinolonen:</b> (Ciproxin)	<b>8</b>	<b>6</b>
Nitrofurantoïne: (Furadantine)	11	26
Overige:	1	0.6
	-----	-----
	100%	100%

